

Le bocage est un **paysage** composé de **parcelles agricoles** et **haies** périmétrales. A partir du Moyen-âge, les forêts sont défrichées au bénéfice de la **culture** et de l'**élevage** sur les terres relativement riches du **bassin rennais**.



1960



2010

Le remembrement, lié à l'évolution du matériel et des besoins en productions agricoles notamment, a ouvert ces paysages, et les haies sont souvent délaissées et non renouvelées.

Un paysage et une ressource



Le Faucon crécerelle est un rapace du bocage

Les **haies** et leurs **talus** ont historiquement un rôle triple : celui de délimiter les propriétés, d'empêcher la divagation du bétail et de servir d'approvisionnement en bois.

Un **élagage** intensif et répété permet de récolter du bois de chauffage, du fourrage, des perches, piquets... On appelle ces tailles en « têtard » lorsque l'on supprime toutes les branches de tête, et en « émonde » lorsque ce sont les branches de tronc qui sont ciblées. Les troncs massifs aux silhouettes trapues ou élancées selon le type de taille font du bois de chauffage ou d'œuvre de qualité.

Les **haies** jouent d'abord des rôles environnementaux : elles limitent l'**érosion** des sols, participent à la **qualité de l'eau**, jouent un rôle **brise-vent** et d'accueil de la **faune auxiliaires** des cultures qui régulent les ravageurs...

Arbres mené en têtard et émonde ou ragosse



En termes de **biodiversité**, la présence de ces **espaces boisés linéaires** denses et de **prairies** ouvertes et fleuries est très **complémentaire** : les prairies sont utilisées comme zone de nourrissage, les fleurs attirant les insectes qui servent de nourriture de base aux petits passereaux, amphibiens et aux petits mammifères, qui eux-mêmes servent de nourriture aux reptiles ou aux rapaces par exemple. Les **haies** sont quant à elles des zones de reproduction et de nidification ou de repos pour tous ces animaux.

Le bocage D'hier et d'aujourd'hui

Des programmes de **restauration des haies** existent sur l'ensemble du territoire du Val d'Ille-Aubigné. Par ailleurs, un certain nombre de **haies** sont inscrites et protégées dans les documents d'**urbanisme**.

On trouve sur le secteur du Feuillet une relique du **bocage historique** de la commune de Melesse. Le maillage y était très dense dans les années 1950, avec des parcelles d'environ 1 ha, complétées d'arbres isolés. En effet, en Ille-et-Vilaine notamment, le **pommier** se cultive en grand au milieu des cultures, le cidre formant la principale boisson du pays. Ces parcelles accueilleraient une densité aujourd'hui difficilement concevable de **prés-vergers**.



L'Europe s'engage en Bretagne / Avec le Fonds européen agricole pour le développement rural / L'Europe investit dans les zones rurales




AMPHIBIÈRE Design




Cynorrhodon
Eglantier

Ces belles baies vitaminées viennent après les fleurs qui se consomment dans les salades.



Mûre
Ronce
En confiture, en gelée, sirop ou dans les gâteaux, ces fruits font le bonheur de tous dès la fin de l'été. Au printemps, les jeunes pousses peuvent se préparer notamment en thé

Baies de Sureau
Sureau noir
On peut consommer les fleurs en beignet, les fruits pour améliorer les confitures ou sirops




Cenelle
Aubépine

Sa texture farineuse et sa saveur insipide font que l'on consommera ce fruit cuit en purée et mélangé par exemple à des cynorrhodons. Les toutes jeunes feuilles et fleurs sont également comestibles


Les délices de la haie

Parmi les fonctions du bocage et de ses haies, la production de fruits permet de nourrir la faune sauvage mais aussi de réjouir les palets des petits et grands. Si dès le printemps on pourra récolter quelques plantes vertes (Alliaire, Ortie, Gléchome, Berce spondyle ...), c'est dès la fin de l'été que de nombreux petits fruits seront au menu des curieux.

Saurez-vous les reconnaître et vous laisser tenter à découvrir des saveurs parfois surprenante ?




Muscardin
Muscardinus avellanarius
Ce petit acrobate au pelage blond-roux dépend du bocage




La présence du Muscardin se détecte aux noisettes rongées d'un trou caractéristique, de forme ronde et régulière

Noisette
Noisetier ou Coudrier
Ces petits fruits entrent dans de nombreuses recettes mais le plaisir de les consommer est surtout en grignotage !



Gland
Chêne pédonculé, Chêne rouvre
S'il n'est pas beaucoup consommé aujourd'hui, il a figuré pendant très longtemps dans les menus, apportant protéines et minéraux. Avec le nombre de chênes dans nos campagnes, c'est une source de nourriture à redécouvrir !



Châtaigne
Châtaignier
Voilà un fruit aisé à récolter. Très riche en glucides, protéines et sels minéraux, il contient frais autant de vitamine C que le citron !